



ACTIDIUM®

**TRAITER ET PRÉVENIR
LES TRYPANOSOMOSES...**



**... GRÂCE À UN
TRYPANOCIDE À BASE DE
CHLORURE D'HOMIDIUM**





GRANDS
RUMINANTS

TRYPANOCIDES ET
ANTI-PROTOZOAIRES

ACTIDIUM®



INDICATIONS

Traitement

Prévention



Trypanosomes

(*Trypanosoma vivax*, *T. brucei* et *T. congolense*)



COMPOSITION

1 comprimé

CHLORURE D'HOMIDIUM250mg

PHÉNAZONE250mg

Excipients q.s.p 1 comprimé



ADMINISTRATION

Voie Injectable



Intramusculaire
profonde dans
le cou



FORME GALÉNIQUE

Comprimé pour solution injectable



POSOLOGIE

Dilution

1 comprimé dans 10mL d'eau stérile

Administration

2 mL pour 50 kg PV
4 mL pour 100 kg PV
8 mL pour 200 kg PV
10 mL pour 250 kg PV



Nombre d'animaux traités par un comprimé :
1 animal de 250 kg de PV

Durée d'utilisation
Durée d'action



Une prise unique
6 semaines



TEMPS D'ATTENTE



LAIT
0 JOUR



VIANDE ET ABATS
28 JOURS



PRÉSENTATIONS



- Comprimé pour solution Injectable
- Flacon de 20 comprimés
- Coffret de 10 flacons

