

**ANTI-INFECTIEUX  
OU ASSIMILÉS**



**RUMINANTS  
PORCINS - EQUINS**



# BIOCYCLINE® 10%

**TRAITER LES INFECTIONS CAUSÉES PAR  
LES BACTÉRIES SENSIBLES À  
L'OXYTÉTACYCLINE ...**



**... GRÂCE À UN ANTIBIOTIQUE  
CIBLÉ À LA TOLÉRANCE  
DÉMONTRÉE**





**RUMINANTS  
PORCINS - EQUINS**

**ANTI-INFECTIEUX  
OU ASSIMILES**

# BIOCYCLINE® 10%



## INDICATIONS



**Bactéries**

*Germes sensibles à l'oxytétracycline*



## COMPOSITION

100 mL de solution

**OXYTÉTRACYCLINE** (chlorhydrate) ..... 10g

Excipients ..... q.s.p. 100mL



## ADMINISTRATION



## FORME GALÉNIQUE

Voie  
Injectable



Sous-cutané  
Intraveineuse lente  
Intramusculaire

Solution injectable



## POSOLOGIE



**Animaux adultes** 1 mL pour 20 kg PV

**Jeunes animaux** 1 mL pour 10 kg PV

**Dilution** : Utilisation pure sans dilution



Bovins, ovins, caprins, porcins: voie I.V lente, voie S.C et voie I.M (partie lâche du cou pour les animaux destinés à la consommation).

Équins : voie I.V lente uniquement

**Durée d'utilisation**



**Une fois par jour  
Pendant 3 à 5 jours**

• Avant l'utilisation de tout antibiotique, il est préférable de s'assurer que la bactérie est sensible à la molécule utilisée en réalisant un antibiogramme.



## TEMPS D'ATTENTE



**LAIT  
3 JOURS**



**VIANDE ET ABATS  
14 JOURS**



## PRESENTATIONS



Solution  
 Injectable  
 Flacon de 50mL  
 Boite de 1 flacon  
**X1**



Solution  
 Injectable  
 Flacon de 100mL  
 Boite de 1 flacon  
**X1**

