

**ANTI-INFECTIEUX
OU ASSIMILÉS**



**RUMINANTS
PORCINS - EQUINS**



BIOCYCLINE® 5%

**TRAITER LES INFECTIONS CAUSÉES
PAR LES BACTÉRIES SENSIBLES À
L'OXYTÉTACYCLINE...**



**... GRÂCE À UN ANTIBIOTIQUE CIBLÉ,
À LA TOLÉRANCE DÉMONTRÉE**





**RUMINANTS
PORCINS - EQUINS**

**ANTI-INFECTIEUX
OU ASSIMILES**

BIOCYCLINE® 5%



INDICATIONS

Traitement



Bactéries

Germes sensibles à l'oxytétracycline



COMPOSITION

100 mL de solution

OXYTÉTRACYCLINE (chlorhydrate) 5g

Excipients q.s.p. 100mL



ADMINISTRATION

Voie
Injectable



Sous-cutané
Intraveineuse lente
Intramusculaire



FORME GALÉNIQUE

Solution injectable



POSOLOGIE



Animaux adultes



1 mL pour 10 kg PV

Jeunes animaux



1 mL pour 5 kg PV



Bovins, ovins, caprins, porcins: voie I.V lente, voie S.C et
voie I.M (partie lâche du cou pour les animaux destinés à la
consommation).

Équins : voie I.V lente uniquement

Durée d'utilisation



**Une fois par jour
pendant 3 à 5 jours**

- Avant l'utilisation de tout antibiotique, il est préférable de s'assurer que la bactérie est sensible à la molécule utilisée en réalisant un antibiogramme.



TEMPS D'ATTENTE



**LAIT
3 JOURS**



**VIANDE ET ABATS
14 JOURS**



PRESENTATIONS



Solution
Injectable
Flacon de 50mL
Boîte de 1 flacon



Solution
Injectable
Flacon de 100mL
Boîte de 1 flacon

