

**ANTIPARASITAIRES
INTERNES**



RUMINANTS



DISTOCUR

***TRAITER TOUS LES VERS DES
RUMINANTS...***



***... GRÂCE À UN ANTIPARASITAIRE
INTERNE EN BOLUS À BASE
DE BITHIONOL SULFOXYDE***



DISTOCUR



INDICATIONS

• **Traitement** • **Prévention** •



Vers plats

Thysaniezia ovilla, Moniezia, Stilesia



Vers ronds

Oesophagostomum



Trématodes

Fasciola Hepatica



Paramphistomes



COMPOSITION

Un bolus 

SULFOXYDE DE BITHIONOL.....2g

Excipients..... q.s.p 2,7g



ADMINISTRATION



FORME GALÉNIQUE

Voie orale



Dans la gueule

Bolus



POSOLOGIE



1 bolus pour 50 kg PV



1/2 bolus pour 25 kg PV

Durée d'utilisation



Une prise unique

Fréquence d'administration

- En début de saison pluvieuse, avec un rappel 15 jours après
- Avant une vaccination, Au sevrage, Avant la mise-bas, Avant la saillie...



TEMPS D'ATTENTE



**LAIT
0 JOUR**



**VIANDE ET ABATS
15 JOURS**



PRESENTATIONS



 Bolus
 Oral
 Pot de 100 boli

 X100



 Bolus
 Oral
 Pot de 1000 boli

 X1000

