

**ANTI-INFECTIEUX  
OU ASSIMILÉS**

# DOXYLOBS 500

**RUMINANTS  
VOLAILLES - PORCINS**



**TRAITER LES INFECTIONS CAUSÉES PAR  
LES BACTÉRIES SENSIBLES À LA  
DOXYCYCLINE....**



**... GRÂCE À UNE POUDRE ORALE  
AVEC UN SEUL ANTIBIOTIQUE  
EFFICACEMENT DOSÉ**



# DOXYLOBS 500



## INDICATIONS



**Bactéries**

*Germes sensibles à la doxycycline*



## COMPOSITION

100 g de poudre

**DOXYCYCLINE** (sous forme chlorhydrate) ..... 50g

Excipients ..... q.s.p. 100g



## ADMINISTRATION



## FORME GALÉNIQUE

Voie orale



Eau  
de boisson



Aliment



Poudre pour solution buvable



ou



Poudre pour aliment



## POSOLOGIE



100g pour 500 -1000L d'eau de boisson

**Durée d'utilisation**



**Pendant 3 à 5 jours**



1g pour 100 kg PV dilué dans un peu d'eau ou  
mélangé à l'aliment **2 fois par jour**

**Durée d'utilisation**



**Pendant 3 à 5 jours**

- N'utiliser que chez les veaux pré ruminants, les agneaux et les chevreaux
- Ne pas utiliser chez des animaux ruminants adultes



## TEMPS D'ATTENTE



**VIANDE  
ET ABATS**



**7 JOURS**

**14 JOURS**

**8 JOURS**

- Ne pas utiliser chez les vaches dont le lait ou les poules dont les oeufs sont destinés à la consommation humaine



## PRESENTATIONS



- Poudre
- Buvable ou sur l'aliment
- Sachet de 100g
- Boîte de 25 sachets



- Poudre
- Buvable ou sur l'aliment
- Pot de 1Kg

