













ANTITIC

LUTTE CONTRE LES TIQUES,
GALE ET POUX DES RUMINANTS



| CLASSE THÉRAPEUTIQUE | PRESENTATION | MODE ADMINISTRATION |
|---|---|---|
|  <p>ANTIPARASITAIRE EXTERNE</p> |  <p>20ml ou 100ml ou 250ml ou 1L</p> |  <p>OU</p> |

| ESPECES | POSOLOGIE | | TEMPS D'ATTENTE |
|--|--|--|--|
|  | <p>PULVÉRISATION</p>   <p>2ml D'ANTITIC POUR 1L D'EAU</p> | BAIN |  <p>VIANDE ET ABATS* LAIT</p> <p>42 JOURS 4 JOURS</p> |
|  | |  <p>SOLUTION A 0,025%</p> |  <p>VIANDE ET ABATS* LAIT</p> <p>28 JOURS 6 JOURS</p> |
|  | |  <p>SOLUTION A 0,05%</p> |  <p>VIANDE ET ABATS* LAIT</p> <p>42 JOURS 4 JOURS</p> |
|  | | |  <p>VIANDE ET ABATS*</p> <p>42 JOURS</p> |

* bien lire la notice au dos du document.

Médicaments vétérinaires responsables