

ANTI-INFECTIEUX

# LOBAMAX PLUS

ANIMAUX DE COMPAGNIE

VOLAILLES

RUMINANTS

EFFICACE SUR LES DIARRHÉES ET INFECTIONS



CLASSE THÉRAPEUTIQUE

MODE ADMINISTRATION



ANTI-INFECTIEUX



ou



ESPECES	POSOLOGIE*	DURÉE TRAITEMENT
	DIARRHÉE DU VEAU > 10ml > 2 À 3 FOIS PAR JOUR	2 À 3 JOURS DE SUITE
	MALADIE DE LA MUQUEUSE ET DIARRHÉE VIRALE > 20 À 30ml > PAR JOUR	3 JOURS DE SUITE
	DIARRHÉE DE L'AGNEAU > 2 À 3ml > 2 À 3 FOIS PAR JOUR	2 À 3 JOURS DE SUITE
	DIARRHÉE DU MOUTON ADULTE > 5 À 8ml > PAR JOUR	2 À 3 JOURS DE SUITE
	CONTRÔLE DE LA FIÈVRE APHTEUSE ET PPR** > 10 À 15ml > PAR JOUR	3 À 5 JOURS CONSÉCUTIFS
	RHINITES INFECTIEUSES OU GRIPPE AVIAIRE (PONDEUSES)** > DILUTION 1: 100 > 3 FOIS PAR JOUR	5 JOURS
	MALADIE DE NEWCASTLE > DILUTION 1: 400 > 2 FOIS PAR JOUR	APRÈS 3 JOURS, 1,5 JOUR > 2 JOURS

\*\* traitement d'appoint \* bien lire la notice au dos du document.

Médicaments vétérinaires responsables

