

LOBIVAC AI-NEW-IB

VACCIN INACTIVÉ CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE (SOUCHE LA SOTA), BRONCHITE INFECTIEUSE (SOUCHE M41) ET LA GRIPPE AVIAIRE DE TYPE H9N2 (SOUCHE L).



CLASSE THÉRAPEUTIQUE	PRESENTATION	MODE ADMINISTRATION
VACCINS INACTIVÉS	 1000 DOSES	 S.C. ou I.M.

ESPECES	VACCINATION	ÂGE	QUANTITÉ	IMMUNITÉ
	1ÈRE	6/8 JOURS	 > 0,24 à 0,4 ml* ANIMAL	 8 SEMAINES MINIMUM
	2NDE	35/40 JOURS	 > 0,5 ml* ANIMAL	 12 SEMAINES MINIMUM
	3ÈME POUR PONDEUSE	2 SEMAINES AVANT PONTE	 > 0,5 ml* ANIMAL	 15 SEMAINES MINIMUM
	4ÈME POUR PONDEUSE	3/4 MOIS APRÈS PONTE	 > 0,5 à 0,8 ml* ANIMAL	 15 SEMAINES MINIMUM

* bien lire la notice au dos du document.

Médicaments vétérinaires responsables