
























































Produit	Composition	Espèces cibles	Spectre	Présentation	Administration	Posologie	Temps d'attente
ACTIDIUM	Chloride d'homidium			 200 COMPRIMÉS	 I.M profonde	<div>  1 COMPRIMÉ  >DANS 10ML* EAU STÉRILISÉ </div> <div>  1mg POUR >CHAQUE Kg POIDS </div> <div>  1 COMPRIMÉ POUR 1 BOVIN DE 250KG </div>	VIANDE 30 jours ----- LAIT NUL
LOBAZEN	Diacéturate Diminazène + Antipyrine	  	  	 10 2.39g 23.9g	 I.M profonde	<div>  DISSOUDRE DANS DE L'EAU STÉRILE </div> <div>  5 ml POUR >100KG DEPOIDS VIF* </div> <div>  10 ml POUR >200KG DEPOIDS VIF* </div>	VIANDE 21 jours ----- LAIT 5 jours
LOBAZEN PLUS	Diacéturate Diminazène + Antipyrine + Vitamines (B12, B6, B1, B2, PP)	  	  	 10 2.39g 23.9g 1g	 I.M profonde	<div>  15 ml POUR >300KG DEPOIDS VIF* </div> <div> 2.36g >15 ml 23.9g >150 ml </div>	VIANDE 21 jours ----- LAIT 5 jours
LOBIDIUM	Isoméтамidium 1g	  		 1g 10 SACHETS	 	<div>   </div> <div> Curatif : 0.25 à 0.5 mg/ par KG PV Préventif : 0.5 à 1 mg/ par KG PV </div>	VIANDE 30 jours ----- LAIT NUL
LOBIDIUM PLUS	Isoméтамidium + Antipyrine + Vitamines (B12, B6, B1, B2, PP, Acide Folique)	  		 125mg 10 SACHETS	 	<div>   </div> <div> 0.25 à 0.5 mg/ par KG PV </div>	VIANDE 30 jours ----- LAIT NUL
SULFA LOBS 33	Sulfadimérazine 33 g	  		 100 ml ou 500ml	 OU 	<div>  3 ml POUR >10KG DEPOIDS VIF* </div> <div>  3/5 JOURS </div>	VIANDE et ABATS: 10 jours LAIT: 5 jours (10 traites) OEUFs: 12 jours. VOLAILE: 14 jours