

TRYPANOCIDES ET
ANTI-PROTOZOAIRES



RUMINANTS



LOBAZEN®

**TRAITER LES TRYPANOSOMOSES,
LES BABÉSIOSES ET LES THEILERIOSES ...**



**... GRÂCE À UNE ACTIVITÉ
TRYPANOCIDE DÉMONTRÉE**



LOBAZEN®



INDICATIONS

Traitement



Trypanosomes

(*Trypanosoma congolense*,
T. vivax et *T. Brucei*.)



Theileria

(*Theileria*
annulata)



Babésia

(*Babesia bovis*, *B. bigemina*, *B. ovis*, et autres espèces de
babésies.)



COMPOSITION

Un sachet de 2,36g 

DIMINAZENE Diacéturate 1,05g
Antipyrine 1,31g

Un sachet de 23,6g 

DIMINAZENE Diacéturate 10,5g
Antipyrine 13,1g



ADMINISTRATION

Voie Injectable



Intramusculaire
profonde



FORME GALÉNIQUE

Granulés pour solution injectable



POSOLOGIE

Dilution

-  2,36 g (1 sachet) pour 15 mL d'eau
-  23,6 mg (1 sachet) pour 150 mL d'eau

Administration

1 mL pour 20 kg PV
5 mL pour 100 kg PV
10 mL pour 200 kg PV
15 mL pour 300 kg PV



Durée d'utilisation



Une prise unique



TEMPS D'ATTENTE



LAIT
5 JOURS



VIANDE ET ABATS
21 JOURS



PRESENTATIONS



-  Poudre pour solution
Injectable
-  Sachet de 2,36 g
-  Boîte de 10 sachets



-  Poudre pour solution
Injectable
-  Sachet de 23,6 g
-  Boîte de 10 sachets

AMM : UEMOA/V/00217/2018/03/17/R1

