

**TRYPANOCIDES ET
ANTI-PROTOZOAIRES**



**RUMINANTS
A. DE COMPAGNIE**



LOBIDIUM®

PRÉVENIR LES TRYPANOSOMOSES ...



**... GRÂCE À UNE ACTIVITÉ
TRYPANOCIDE DÉMONTRÉE**



LOBIDIUM®



INDICATIONS

Traitement

Prévention



Trypanosomes

(*Trypanosoma congolense*, *T. vivax*, *T. brucei* et *T. evansi*.)



COMPOSITION

Un sachet de 1g

Chlorhydrate de chlorure d'ISOMETAMIDIUM..... 1g



ADMINISTRATION

Voie
Injectable



Zébus, taurins, Buffles, Ovins,
caprins, Chevaux et Chiens
Voie intramusculaire profonde

Chameaux et dromadaires
Voie intraveineuse lente



FORME GALÉNIQUE

Poudre pour solution injectable



POSOLOGIE

Dilution

1 sachet pour 100 mL d'eau (solution à 1%)

Administration

Traitement

1 mL pour 40 kg PV
5 mL pour 200 kg PV
10 mL pour 400 kg PV
15 mL pour 600 kg PV

Prévention

1 mL pour 20 kg PV
5 mL pour 100 kg PV
10 mL pour 200 kg PV
15 mL pour 300 kg PV



Nombres d'animaux traités par un sachet :

- Prévention : 8 animaux de 250 kg
- Traitement : 2 animaux de 250 kg

Durée d'utilisation
Durée d'action



Une prise unique
3 à 4 mois



TEMPS D'ATTENTE



LAIT
0 JOUR



VIANDE ET ABATS
1 MOIS



PRESENTATIONS



Poudre pour solution
Injectable
Sachet de 1 g
Boîte de 10 sachets



Poudre pour solution
Injectable
Sachet de 1 g
Boîte de 10 sachets
Coffret de 10 boîtes

AMM : UEMOA/V/00164/2017/03/18/R1

