

TRYPANOCIDES ET
ANTI-PROTOZOAIRES



RUMINANTS
A. DE COMPAGNIE



LOBIDIUM® PLUS

PRÉVENIR LES TRYPANOSOMOSES ...



**... GRÂCE À UNE ACTIVITÉ
TRYPANOCIDE DÉMONTRÉE**



LOBIDIUM® PLUS



INDICATIONS

Traitement

Prévention



Trypanosomes

(*Trypanosoma congolense*, *T. vivax*, *T. brucei* et *T. evansi*.)



COMPOSITION

Un sachet de 1g

Chlorhydrate de chlorure d'**ISOMETAMIDIUM** ..125mg

Vitamine B110mg

Vitamine B123mg

Vitamine B21mg

Vitamine B66mg

Vitamine PP10mg

Acide Folique111,5mg

Excipients q.s.p. 1g



ADMINISTRATION

Voie Injectable



Zébus, taurins, Buffles, Ovins, caprins, Chevaux et Chiens
Voie intramusculaire profonde

Chameaux et dromadaires
Voie intraveineuse lente



FORME GALÉNIQUE

Poudre pour solution injectable



POSOLOGIE

Dilution

1 sachet pour 100 mL d'eau (solution à 1%)

Administration

Traitement

0.6 mL pour 25 kg PV

2.4 mL pour 100 kg PV

4.8 mL pour 200 kg PV

Prévention

1.2 mL pour 25 kg PV

4.8 mL pour 100 kg PV

9.6 mL pour 200 kg PV



KG

Nombres d'animaux traités par un sachet :

- Prévention : 1 animal de 250 kg

- Traitement : 2 animaux de 250 kg

Durée d'utilisation
Durée d'action



Une prise unique
2 à 4 mois



TEMPS D'ATTENTE



LAIT
0 JOURS



VIANDE ET ABATS
1 MOIS



PRESENTATIONS



125mg X10

Poudre pour solution Injectable
Sachet de 125g
Boîte de 10 sachets



125g X10

Poudre pour solution Injectable
Sachet de 125g
Boîte de 10 sachets
Coffret de 10 boîtes

AMM : UEMOA/V/000324/2018/09/29

