

**ANTIPARASITAIRES
INTERNES & EXTERNES**

**RUMINANTS
CAMELINS**



IVERMEC

**TRAITER LES PARASITES
EXTERNES ET LES PARASITES
INTERNES DES RUMINANTS...**



**... GRÂCE À UN ENDECTOCIDE
INJECTABLE À BASE D'IVERMECTINE**



IVERMEC



INDICATIONS

Traitement

Prévention



Gales

Psoroptes ovis
(syn. *P. communis*
var. *bovis*),
Sarcoptes scabiei
var.
bovis, *Chorioptes*
bovis



Tiques

Ornithodoros
savignyi



Poux

Linognathus
vituli,
Haematopinus
eurysternus,
Solenopotes
capillatus



Vers Ronds

Ostertagia ostertagi, *O. lyrata*,
Haemonchus placei, *Trichostrongylus*
axei, *T. colubriformis*, *Cooperis*
oncophora, *C. punctata*, *Oesophagosto-*
mum radiatum, *Nematodirus helvetianus*,
N. spathiger, *Strongyloides papillosus*,
Bunostomum phlebotomum, *Toxocara*
vitulorum, *Dictyocaulus viviparus*,
Parafilaria bovicola, *Thelazia spp*



Oestrus

Hypoderma bovis, *H.*
lineatum Berne,
Chrysomya bezziana

* pour la suite des indications, voir la notice



COMPOSITION

100 mL de solution

IVERMECTINE 1g

Excipients q.s.p 100ml



ADMINISTRATION



FORME GALÉNIQUE

Solution injectable

Voie Injectable



Sous-cutanée



POSOLOGIE



1 mL pour 50 kg PV



0,5 mL pour 25 kg PV

Dilution : Utilisation pure sans dilution

Durée d'utilisation



Une prise unique



TEMPS D'ATTENTE



LAIT
BOVINS : 28 JOURS
OVINS : 21 JOURS
CAMELINS : INTERDIT CHEZ LES FEMELLES EN LACTATION
DONT LE LAIT EST DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE.



VIANDE ET ABATS
BOVINS : 49 JOURS
OVINS : 28 JOURS
CAMELINS : 28 JOURS



PRESENTATIONS



Solution
Injectable
(sous cutanée)
Flacon 10mL
Boîte de 1 flacon



Solution
Injectable
(sous cutanée)
Flacon 20mL
Boîte de 1 flacon



Solution
Injectable
(sous cutanée)
Flacon 50mL
Boîte de 1 flacon



Solution
Injectable
(sous cutanée)
Flacon 100mL
Boîte de 1 flacon



Solution
Injectable
(sous cutanée)
Flacon 10mL
Boîte de 10 flacons

