



LIVACOX® Q

**VACCINER LES POULES
PONDEUSES CONTRE LA
COCCIDIOSE ...**



**... GRÂCE À UN VACCIN VIVANT
EFFICACE ET FACILE
D'UTILISATION**





VOLAILLES

VACCINS

LIVACOX® Q



INDICATIONS

Prévention



Coccidies

Vaccin quadrivalent vivant atténué contre la coccidiose des volailles domestiques
(*Eimeria acervulina*, *Eimeria maxima*, *Eimeria tenella*, *Eimeria necatrix*)



COMPOSITION

Flacon de solution contenant 1000 ou 5000 doses de vaccin

1 dose de solution vaccinale

- **OOCYSTES COCCIDIENS** *Eimeria acervulina* 3 -5. 10², *Eimeria tenella* 3 -5. 10², *Eimeria maxima* 3 -5. 10², *Eimeria necatrix* 1. 10²
- Excipients : q.s.p. 1 dose



ADMINISTRATION



FORME GALÉNIQUE

Solution orale / nébulisable à diluer

Voie Orale



Eau de boisson

Voie
Respiratoire



Nébulisation



POSOLOGIE

10 mL de préparation = 1 000 doses

50 mL de préparation = 5 000 doses

Dilution

Diluer dans l'eau de boisson
1L d'eau de boisson / Jour d'âge/ 1.000 sujets
Exemple : Pour 1000 sujets de 4 jours d'âge
→ Diluer 10mL dans 4L d'eau de boisson



Pour des poussins d'1 jour

Diluer dans l'eau potable
1L d'eau potable / 1.000 sujets
Pour 1000 sujets → Diluer 10mL dans 1L



Administration

- Les animaux doivent consommer la préparation dans les 2 heures (ce qui peut être favorisé par l'assoiffement 2 heures avant la vaccination).

- Le vaccin peut être dilué dans l'eau contenant le colorant alimentaire (pour faciliter le contrôle visuel de l'application). Il est ensuite pulvérisé sur les poussins. Ces derniers doivent rester dans la caisse pendant au moins 3 heures.

Durée d'utilisation



Une prise unique

IMMUNITÉ : 10 jours après la vaccination et pour toute la vie de la volaille.

- Ne vacciner que les animaux en bonne santé.
- La préparation doit être administrée aux poussins âgés de 1 à 10 jours, mais les poules peuvent être vaccinées à n'importe quel âge durant l'élevage.
- Le mélange d'aliments donné aux poules 2 jours avant et 14 jours après la vaccination, ne doit pas contenir d'anticoccidiens à dose curative, ni de Sulfamides.



TEMPS D'ATTENTE



VIANDE ET ABATS
0 JOUR



LAIT
0 JOUR



PRESENTATIONS



- Solution
- Buvable
- Nébulisable
- Flacon de 10 mL de 1000 doses
- Boîte de 10 flacons



- Solution
- Buvable
- Nébulisable
- Flacon de 50 mL de 5000 doses
- Boîte de 10 flacons

CONSERVATION

- 2-8°C
- La durée de conservation est de 9 mois

