



LIVACOX® T

**VACCINER LES POULETS DE
CHAIR CONTRE LA COCCIDIOSE ...**



**... GRÂCE À UN VACCIN VIVANT
EFFICACE ET FACILE
D'UTILISATION**





VOLAILLES

VACCINS

LIVACOX® T



INDICATIONS

Prévention



Coccidies

Vaccin trivalent vivant atténué contre la coccidiose des volailles domestiques
(*Eimeria acervulina*, *Eimeria maxima*, *Eimeria tenella*)



COMPOSITION

Flacon de solution contenant 1000 ou 5000 doses de vaccin

1 dose de solution vaccinale

- **OOCYSTES COCCIDIENS**, *Eimeria acervulina* 3 -5. 10², *Eimeria tenella* 3 -5. 10², *Eimeria maxima* 3 -5. 10².
- Excipients : q.s.p. 1 dose



ADMINISTRATION



FORME GALÉNIQUE

Solution orale / nébulisable à diluer

Voie Orale



Eau de boisson

Voie
Respiratoire



Nébulisation



POSOLOGIE

10 mL de préparation = 1 000 doses

50 mL de préparation = 5 000 doses

Dilution

Diluer dans l'eau de boisson

1L d'eau de boisson / Jour d'âge/ 1.000 sujets

Exemple : Pour 1000 sujets de 4 jours d'âge

→ Diluer 10mL dans 4L d'eau de boisson



1mL dans 19mL d'eau pour 100 animaux,
soit 20mL à nébuliser pour 100 volailles

Administration

- Les animaux doivent consommer la préparation dans les 2 heures (ce qui peut être favorisé par l'assoiffement 2 heures avant la vaccination).

Le vaccin peut être dilué dans l'eau contenant le colorant alimentaire

- (pour faciliter le contrôle visuel de l'application). Il est ensuite pulvérisé sur les animaux. Ces derniers doivent rester dans la caisse pendant au moins 3 heures.

Durée d'utilisation



Une prise unique

IMMUNITÉ : 10 jours après la vaccination et pour toute la vie de la volaille.

- Ne vacciner que les animaux en bonne santé.
- La préparation doit être administrée aux poussins âgés de 1 à 10 jours..
- Le mélange d'aliments donné aux poules 2 jours avant et 14 jours après la vaccination, ne doit pas contenir d'anticoccidiens à dose curative, ni de Sulfamides.



TEMPS D'ATTENTE



VIANDE ET ABATS
0 JOUR



LAIT
0 JOUR



PRESENTATIONS



- Solution
- Buvable
- Nébulisable
- Flacon de 10 mL de 1000 doses
- Boîte de 10 flacons



- Solution
- Buvable
- Nébulisable
- Flacon de 50 mL de 5000 doses
- Boîte de 10 flacons

CONSERVATION

- 2-8°C
- La durée de conservation est de 9 mois

