

VACCINS

LOBALIVE[®] ANTHRAX

RUMINANTS
EQUINS



***VACCINER CONTRE LE CHARBON
BACTERIDIEN DES RUMINANTS ET
DES EQUINS...***



***... GRÂCE À UN VACCIN VIVANT
EFFICACE ET FACILE
D'UTILISATION***





RUMINANTS
EQUINS

VACCINS

LOBALIVE[®] ANTHRAX



INDICATIONS

Prévention



Bactéries

Vaccin vivant atténué contre le charbon bactérien (Anthrax)
(*Bacillus anthracis*)



COMPOSITION

Flacon de lyophilisat contenant 50 ou 100 doses de vaccin
1 dose de vaccin

- **BACILLUS ANTHRACIS**, Souche Sterne 34 F2, (adjuvée sur saponine) contenant 107 spores viables
Concentration en saponine : 1 à 2% (Les spores sont lyophilisées avec la saponine)
- Excipient : q.s.p. 1 dose



ADMINISTRATION



FORME GALÉNIQUE

Voie Injectable



- Sous-cutanée
- Peau lâche du cou
 - Peau lâche du cou ou
 - Face interne de la cuisse
 - Face interne de la cuisse
 - Peau du cou



POSOLOGIE

Dilution

- Reconstituer le vaccin :
- 1 flacon de lyophilisat de 100 doses pour 100 mL de diluant.
 - 1 flacon de lyophilisat de 50 doses pour 50 mL de diluant

Administration

- : 1 mL
- : 0.5 mL
- : 0.5 mL
- : 1 mL

Durée d'utilisation
Durée d'action



Une prise unique
Rappel: tous les ans

IMMUNITÉ : 10 jours après la vaccination et pour une durée de 12 mois.



TEMPS D'ATTENTE



VIANDE ET ABATS
6 SEMAINES

NE PAS ADMINISTRER AUX
FEMELLES GESTANTES



PRESENTATIONS



X1

- Lyophilisat pour solution injectable
- Sous cutané (Après dilution dans le diluant)
- Flacon de lyophilisat à diluer dans 50 mL de diluant (50 doses)



X1

- Lyophilisat pour solution injectable
- Sous cutané (Après dilution dans le diluant)
- Flacon de lyophilisat à diluer dans 100 mL de diluant (100 doses)

CONSERVATION

- 4°C
- La durée de conservation est de 2 ans

