



# LOBALIVE<sup>®</sup> DNCB

***VACCINER LES RUMINANTS CONTRE LA  
DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE  
BOVINE ...***



***... GRÂCE A UN VACCIN VIVANT ATTÉNUÉ  
LYOPHILISÉ A L'IMMUNITÉ RAPIDE ET  
DURABLE***





# LOBALIVE®

## DNCB



### INDICATIONS

#### Prévention



#### Virus

Vaccin lyophilisé atténué contre la Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine : DNCB  
(Capripoxvirus)



### COMPOSITION

Flacon de lyophilisat contenant 50 doses de vaccin  
1 mL de lyophilisat reconstitué avec 1 mL de diluant

- **10<sup>4</sup> TCID<sub>50</sub>** de virus vivant atténué lyophilisé
- Souche vaccinale : Capripoxvirus souche PANVAC



### ADMINISTRATION



### FORME GALÉNIQUE

Voie Injectable



Sous-cutané  
Intérieur de la cuisse



Lyophilisat

Diluant\*

\* Diluant vendu à part



### POSOLOGIE

#### Dilution

Reconstituer le vaccin : 1 flacon de lyophilisat de 50 doses pour 50 mL de diluant

#### Administration

Dose : 1 mL par bovin  
Seuls les animaux sains doivent être vaccinés.

**Durée d'utilisation**  
**Durée d'action**



**Une prise unique**  
**Rappel: tous les 6 mois**

**IMMUNITÉ : 8 jours après la vaccination et pour une durée de 2 ans.**

- Les anticorps maternels chez les veaux peuvent avoir une influence sur l'efficacité du vaccin.
  - Les veaux issus de vaches vaccinées doivent être vaccinés à l'âge de 6 mois.
  - Les veaux issus de vaches non vaccinées peuvent être vaccinés à tout âge.
- Bien que ce vaccin ait été largement testé dans une grande variété de conditions, une inaction peut survenir pour des raisons diverses. Si cela est suspecté, consulter un vétérinaire.



### TEMPS D'ATTENTE



**VIANDE  
ET ABATS  
21 JOURS**

\* 21 jours est un délai d'attente standard fixé selon la législation sud-africaine pour tous les produits vaccinaux. Si la législation nationale l'exige, un autre délai d'attente peut également être autorisé.



### PRESENTATIONS



X1



Lyophilisat pour solution injectable  
Sous cutané (Après dilution dans le diluant)  
Flacon de lyophilisat à diluer dans 50 mL de diluant (50 doses)

#### CONSERVATION

- +4 à +8°C
- La durée de conservation est de deux ans

