

VACCINS

VOLAILLES



LOBALIVE® NEW

**VACCINER LES POULES CONTRE
LA MALADIE DE NEWCASTLE...**



**... GRÂCE À UN VACCIN VIVANT
EFFICACE ET FACILE
D'UTILISATION**





VOLAILLES

VACCINS

LOBALIVE[®] NEW



INDICATIONS

Prévention



Virus

Vaccin vivant atténué contre la maladie de Newcastle (Paramyxovirus)



COMPOSITION

Flacon de lyophilisat contenant 500-1000 doses de vaccin
1 dose de vaccin

- VIRUS AVIAIRE DE LA MALADIE DE NEWCASTLE** (souche La Sota) Minimum **10^{6.5} DIE₅₀***
- Excipients : q.s.p. 1 dose

* **DIE₅₀** = dose infectant 50 % des embryons : titre viral causant une infection chez 50 % des embryons inoculés avec le virus



ADMINISTRATION

Voie Orale



Eau
de boisson

Voie Oculonasale



Instillation

Voie Respiratoire



Nébulisation



FORME GALÉNIQUE

Lyophilisat pour solution
buvable/oculonasale/nébulisable



Lyophilisat

Diluant*

* Diluant vendu à part



POSOLOGIE

Dilution

Pour 500 volailles âgées de 5-10 jours, dissoudre 1000 doses de vaccin dans 5 à 10L d'eau (5-10mL par volaille).

Pour 500 volailles âgées de plus de 10 jours, dissoudre 1000 doses de vaccin dans 10 à 20L d'eau (10-20mL par volaille).

Dissoudre 1000 doses de vaccin dans 30mL d'eau, puis administrer 1 goutte par oeil ou dans 1 narine de chaque poulet. Pour 1000 volailles.

Dans un élevage collectif de 1000 volailles, dissoudre 1000 doses dans 10 à 40L d'eau, puis nébuliser sur les animaux.

Administration

- Dissoudre la quantité nécessaire de vaccin dans de l'eau fraîche, non chlorée, exempte de détergents, de désinfectants et d'ions métalliques.
- Il est recommandé de priver les oiseaux d'eau potable 4 heures avant administration afin de s'assurer qu'ils consomment rapidement la dose vaccinale.
- Le vaccin doit être consommé en moins de 4 heures.

- Reconstituer le vaccin selon la notice, puis déposer 1 goutte (=0.03mL) dans l'oeil ou la narine de chaque poulet à l'aide d'un compte-gouttes adapté.
- Tenir la tête du poulet penchée d'un côté et instiller une goutte de vaccin dans l'oeil de l'animal. S'assurer que le vaccin diffuse sur toute la surface de l'oeil avant de relâcher l'animal.

- Utiliser un matériel de nébulisation afin de diffuser la solution vaccinale dans l'air du local contenant les oiseaux.

Durée d'utilisation



Une prise unique

- Le vaccin peut être utilisé en primo-vaccination ou en rappel chez les poulets (poules de chair, poulettes, poules adultes, et les poussins âgés de 5-10 jours et plus).



TEMPS D'ATTENTE



VIANDE ET ABATS
0 JOUR



OEUFS
0 JOUR



PRESENTATIONS



X1



Lyophilisat pour solution

Buvable

Oculonasale

Nébulisable

Flacon de lyophilisat à diluer (500 - 1000 doses)

CONSERVATION

- 2-8°C
- La durée de conservation est de deux ans

