



LOBALIVE[®] S&G POX

***VACCINER CONTRE LA VARIOLE
OVINE ET CAPRINE...***



***... GRÂCE À UN VACCIN VIVANT
EFFICACE ET FACILE
D'UTILISATION***





LOBALIVE[®] S&G POX



INDICATIONS

Prévention



Virus

Vaccin vivant atténué contre la variole ovine (Clavelée) et caprine (Poxvirus)



COMPOSITION

Flacon de lyophilisat contenant 50 ou 100 doses de vaccin
1 dose de vaccin

- VIRUS DE LA VARIOLE OVINE ET CAPRINE**, Souche CVCC AV41 avec un titre $\geq 1 \times 10^{3.5}$ TCID₅₀.
TCID₅₀ : Dose infectieuse 50 % en culture tissulaire
- Excipient : q.s.p. 1 dose



ADMINISTRATION



FORME GALÉNIQUE

Voie Injectable



Sous-cutanée
Intérieur de la hanche ou
dessous de la queue



POSOLOGIE

Dilution

Reconstituer le vaccin :

- 1 flacon de lyophilisat de 100 doses pour 100 mL de diluant.
- 1 flacon de lyophilisat de 50 doses pour 50 mL de diluant

Administration

Dose : 1 mL par animal
Seuls les animaux sains doivent être vaccinés.

Durée d'utilisation
Durée d'action



Une prise unique
Rappel: tous les ans

IMMUNITÉ : 4 à 5 jours après la vaccination et pour une durée de 12 mois.



TEMPS D'ATTENTE



VIANDE ET ABATS
0 JOUR



LAIT
0 JOUR



PRESENTATIONS



X1



Lyophilisat pour solution injectable



Sous cutané (Après dilution dans le diluant)



Flacon de lyophilisat à diluer dans 50 mL de diluant (50 doses)



X1



Lyophilisat pour solution injectable



Sous cutané (Après dilution dans le diluant)



Flacon de lyophilisat à diluer dans 100 mL de diluant (100 doses)

CONSERVATION

- 24 mois à une température inférieure à -15°C.
- 18 mois à une température de 2°C à 8°C.

