

TRYPANOCIDES ET
ANTI-PROTOZOAIRES



RUMINANTS



LOBAZEN[®] PLUS

**TRAITER LES TRYPANOSOMOSES,
LES BABÉSIOSES ET LES THEILERIOSES ...**



**... GRÂCE À UNE ACTIVITÉ
TRYPANOCIDE DÉMONTRÉE**



LOBAZEN[®] PLUS



INDICATIONS

Traitement



Trypanosomose

(*Trypanosoma congolense*,
T. vivax et *T. Brucei*.)



Theileriose

(*Theileria*
annulata)



Babésiose

(*Babesia bovis*, *B. bigemina*, *B. ovis*, et autres espèces de babésies.)



COMPOSITION

Un sachet de 2,39g 

DIMINAZENE Diacéturate 1,05g
Antipyrine 1,31g
Vitamine B12 3mg
Vitamine B6 6mg
Vitamine B1 10mg
Vitamine B2 1mg
Vitamine PP 10mg

Un sachet de 23,9g 

DIMINAZENE Diacéturate 10,5g
Antipyrine 13,1g
Vitamine B12 30mg
Vitamine B6 60mg
Vitamine B1 100mg
Vitamine B2 10mg
Vitamine PP 100mg



ADMINISTRATION

Voie Injectable



Intramusculaire
profonde



FORME GALÉNIQUE

Granulés pour solution injectable



POSOLOGIE

Dilution

-  2,39 g (1 sachet) pour 15 mL d'eau
-  23,9 mg (1 sachet) pour 150 mL d'eau

Administration

1 mL pour 20 kg PV
5 mL pour 100 kg PV
10 mL pour 200 kg PV
15 mL pour 300 kg PV



Durée d'utilisation



Une prise unique



TEMPS D'ATTENTE



LAIT
5 JOURS



VIANDE ET ABATS
21 JOURS



PRESENTATIONS



Poudre pour solution
Injectable



Sachet de 2,39 g



Boîte de 10 sachets



Poudre pour solution
Injectable



Sachet de 23,9 g



Boîte de 10 sachets

AMM : UEMOA/V/00389/2018/09/29

