

**TRYPANOCIDES ET
ANTI-PROTOZOAIRES**




VOLAILLES



LOBICOX®

**TRAITER LES COCCIDIES DES
VOLAILLES...**



**... GRÂCE À UN ANTICOCCIDIEN
LARGE SPECTRE À BASE DE
SULFADIMIDINE ET DE DIAVERIDINE
ENRICHIS EN VITAMINES**





TRYPANOCIDES ET
ANTI-PROTOZOAIRES

LOBICOX®



INDICATIONS

Traitement

Prévention



Coccidies

(Eimeria Acervulina, E. Maxima, E. Tenella, E. Brunetti, E. Necatrix, E. Mitis, E. Mivati, E. Adenoides, E. Meleagrimitis)



COMPOSITION

100 g de poudre

SULFADIMIDINE SODIQUE.....80mg

DIAVÉRIDINE.....8mg

VITAMINE K3.....4,3g

SULFADIMIDINE SODIQUE.....3,1g

Excipients..... q.s.p. 100g



ADMINISTRATION

Voie orale



Eau
de boisson



FORME GALÉNIQUE

Poudre pour solution buvable



POSOLOGIE

1 g de LOBICOX pour 4 litres d'eau de boisson.

- un de 100g pour 400 litres d'eau
- un de 15g pour 60 litres d'eau

TRAITEMENT

Durée d'utilisation



Pendant 3 à 5 jours

PRÉVENTION

Durée d'utilisation



Pendant 7 jours

À utiliser lorsqu'il n'y a plus de coccidiostatique dans l'aliment



TEMPS D'ATTENTE



ŒUF
12 JOURS



VIANDE ET ABATS
12 JOURS



PRESENTATIONS



Poudre
Buvable
Sachet de 15g
Boîte de 100 sachets



Poudre
Buvable
Sachet de 100g
Boîte de 25 sachets



Poudre
Buvable
Sachet de 100g
Boîte de 10 sachets



Poudre pour solution
Buvable
Pot de 1Kg

AMM : UEMOA/V/00330/2018/09/29/R1

