



LOBIVAC AI-NEW

**VACCINER LES POULES
CONTRE LA GRIPPE
AVIAIRE ET LA MALADIE
DE NEWCASTLE**



**... GRÂCE À UN VACCIN INACTIF
EFFICACE ET FACILE
D'UTILISATION**





VOLAILLES

VACCINS

LOBIVAC AI-NEW



INDICATIONS

Prévention



Virus

Vaccin inactivé contre la grippe aviaire (Influenzavirus) et la maladie de Newcastle (Paramyxovirus)



COMPOSITION

Flacon de solution contenant 200 à 1000 doses de vaccin (en fonction de la taille du flacon)
1 dose de vaccin (0.5mL)

- **VIRUS AVIAIRE DE LA MALADIE DE NEWCASTLE** (Souche LaSota) Minimum **$10^{8.17}$ EID₅₀***
- **VIRUS DE LA GRIPPE AVIAIRE** (Sous type H9, Souche WD) Minimum **$10^{7.175}$ EID₅₀***

* **DIE₅₀** = dose infectant 50 % des embryons : titre viral causant une infection chez 50 % des embryons inoculés avec le virus



ADMINISTRATION



FORME GALÉNIQUE

Voie Injectable



Sous cutané à la base
arrière du cou
Intramusculaire dans la
partie antérieure des
muscles du bréchet

Solution injectable



POSOLOGIE

Dilution

Utiliser le produit pur

Administration

- 0.3 mL pour les poulets de moins de 4 semaines.
- 0.5 mL pour les poulets de plus de 4 semaines.

Durée d'utilisation
Durée d'action



Une prise unique
Rappel: tous les 10 à 12 mois

IMMUNITÉ : 8 jours après la vaccination pour atteindre son maximum 2 semaines après

- Flacon de 100mL : 200 doses (poulets et poules) ou 330 doses (poussins).
- Flacon de 250mL : 500 doses (poulets et poules) ou 830 doses (poussins).
- Flacon de 500mL : 1000 doses (poulets et poules) ou 1665 doses (poussins).



TEMPS D'ATTENTE



VIANDE ET ABATS
0 JOUR



OEUFS
0 JOUR



PRESENTATIONS



X1

Solution
 Injectable sous cutané
ou intramusculaire
 Flacon 100mL



X1

Solution
 Injectable sous cutané
ou intramusculaire
 Flacon 500mL



X1

Solution
 Injectable sous cutané
ou intramusculaire
 Flacon 250mL

CONSERVATION

- 12 mois à une température de 2°C - 8°C
- 2 ans à une température de -15°C

