



LOBIVAC DHPPiL+R

**VACCINER LES CHIENS
CONTRE LA MALADIE DE
CARRÉ (D), L'HÉPATITE DE
RUBARTH (H), LA
PARVOVIROSE (P), LA TOUX DE
CHENIL (PI) ET LA LEPTOSPIROSE (L)
ET LA RAGE (R)...**



**... GRÂCE À UN VACCIN
INACTIVÉ TRÈS COMPLET,
EFFICACE ET FACILE
D'UTILISATION**





CHIENS

VACCINS

LOBIVAC DHPPiL+R



INDICATIONS

Prévention



Virus



Bactéries

Vaccin inactivé contre la Maladie de Carré (Distemper), l'Hépatite contagieuse canine (Hépatite de Rubarth), la Parvovirose (Parvovirus), la Toux de Chenil (Parainfluenza), et la Leptospirose (Leptospirosis sérotypes *L. icterohaemorrhagiae*, *L. grippotyphosa* et *L. sejroe*)



COMPOSITION

1 flacon de solution + 1 flacon de lyophilisat contenant 1 dose de vaccin
1 dose de vaccin (1mL)

Lyophilisat :

- **VIRUS FEBRIS CONTAGIOSAE CANIS ATTENUATUM** $10^{2.7} - 10^{4.5}$ DIE_{50}
- **VIRUS LARYNGOTRACHEITIDIS CONTAGIOSAE CANIS ATTENUATUM** $10^{3.5} - 10^{7.5}$ $CCID_{50}$
- **PARVOVIRUS ENTERITIDIS CANIS ATTENUATUM** $10^{2.1} - 10^{3.6}$ HAU,
- **VIRUS PARAINFLUENSIS CANIS ATTENUATUM** $10^{3.0} - 10^{6.0}$ $CCID_{50}$
- **LEPTOSPIRA ICTEROHAEMORRHAGIAE INACTIVATA, LEPTOSPIRA GRIPPOTYPHOSA INACTIVATA, LEPTOSPIRA SEJROE INACTIVATA** Q. S. pour obtenir une réponse sérologique expérimentale sur animaux à un titre min. de 1:32 d'anticorps spécifiques.

DIE_{50} – dose provoquant 50% d'infection sur des embryons de poulet.

$CCID_{50}$ – dose provoquant 50% d'infection sur des cultures cellulaires.

HAU – Unité d'hémagglutination.

Solution :

- **VIRUS RABIQUE INACTIVÉ MIN. 2 UI**

Adjuvant : gel d'hydroxyde d'aluminium

Excipients :

- Thiomersal < 0.1 mg
- Autres excipientsq.s.p. 1mL



ADMINISTRATION



FORME GALÉNIQUE

Lyophilisat et solution pour solution injectable

Voie Injectable



Sous-cutanée



Lyophilisat

Solution



POSOLOGIE

Dilution

Dissoudre la partie lyophilisée dans 1 mL de la partie solution immédiatement avant utilisation

Administration

Dose : 1 mL par animal
Seuls les animaux sains doivent être vaccinés à partir de 3 mois d'âge.

Durée d'utilisation
Durée d'action



Une primovaccination
(une injection à 6-8 semaines puis une deuxième 3 semaines après)*
Rappel: tous les ans

IMMUNITÉ : 2 à 3 semaines après la primo-vaccination et pour une durée de 1 an.

*Il est conseillé d'administrer une troisième dose de vaccin 3 semaines après la deuxième dose chez les jeunes dotés d'une immunité colostrale.



TEMPS D'ATTENTE

Ne pas utiliser chez les animaux destinés à la consommation humaine.



PRESENTATIONS



X12



Lyophilisat + Solution à mélanger

Injectable sous cutané



Flacon de lyophilisat

+ Flacon de 1mL de solution



Boîte de 6 flacons de lyophilisat

+ 6 flacons de solution (Chaque boîte contient 6 doses)

CONSERVATION

- 2-8°C
- La durée de conservation est de 2 ans

