



LOBIVAC FMD

**VACCINER LES
RUMINANTS CONTRE LA
FIÈVRE APHTEUSE...**



**... GRÂCE À UN VACCIN INACTIVÉ
TRIVALENT EFFICACE ET FACILE
D'UTILISATION**





RUMINANTS

VACCINS

LOBIVAC FMD



INDICATIONS

Prévention



Virus

Vaccin inactivé contre la fièvre aphteuse (Aphthovirus)



COMPOSITION

Flacon de solution contenant 25 à 100 doses de vaccin (en fonction de la taille du flacon et de l'espèce)

- **VIRUS DE LA FIEVRE APHTEUSE** (Type O (souche OHM / 02), A (souche AKT-III) et Asia 1 (souche KZ / 03)) Avant l'inactivation, le niveau de virus minimum doit être de **$10^{7.5}LD_{50}/0.2ML$** .



ADMINISTRATION



FORME GALÉNIQUE

Solution injectable

Voie Injectable



Intramusculaire dans le cou



POSOLOGIE

Dilution

Utiliser le produit pur

Administration

- 2mL par bovin
- 1mL par mouton

Durée d'utilisation
Durée d'action



Une prise unique
Rappel: tous les 6 mois

- Flacon de 50mL : 25 doses (bovins) ou 50 doses (ovins).
- Flacon de 100mL : 50 doses (bovins) ou 100 doses (ovins).



TEMPS D'ATTENTE



VIANDE ET ABATS
0 JOUR



LAIT
0 JOUR



PRESENTATIONS



X1

- Solution
- Injectable sous cutané ou intramusculaire
- Flacon 50mL



X10

- Solution
- Injectable sous cutané ou intramusculaire
- Flacon 50mL
- Boîte de 10 flacons



X1

- Solution
- Injectable sous cutané ou intramusculaire
- Flacon 100mL

CONSERVATION

- 12 mois à une température de 2°C - 8°C

