



LOBIVAC® NEW

VACCINER LES POULES CONTRE LA MALADIE DE NEWCASTLE...



... GRÂCE À UN VACCIN INACTIVÉ AUX MULTIPLES PRÉSENTATIONS





VOLAILLES

VACCINS

LOBIVAC® NEW



INDICATIONS

Prévention



Virus

Vaccin inactivé contre la maladie de Newcastle (Paramyxovirus)



COMPOSITION

Flacon de solution contenant 400, 100 ou 1 000 doses de vaccin
1 dose de vaccin

- **Virus inactivé de la maladie de Newcastle** titrant min. **50DP50** (Dose Protectrice de 50% inhibant l'hémagglutination)
- Souche vaccinale : LaSota



ADMINISTRATION



FORME GALÉNIQUE

Voie Injectable



Sous cutané à la base
arrière du cou
Intramusculaire dans la
partie antérieure des
muscles du bréchet

Solution injectable



POSOLOGIE

Dilution

Utiliser le produit pur

Administration

- 0,2 mL par sujet pour les poussins de moins de 2 semaines.
- 0,5 mL par sujet pour les poulets.

Durée d'utilisation
Durée d'action



Une prise unique
Rappel: tous les 10 à 12 mois

IMMUNITÉ : 8 jours après la vaccination pour atteindre son maximum 2 semaines après

- Flacon de 20 mL : 40 doses (poulets et poules) ou 100 doses (poussins).
- Flacon de 50 mL : 100 doses (poulets et poules) ou 250 doses (poussins).
- Flacon de 500 mL : 1000 doses (poulets et poules) ou 2500 doses (poussins).



TEMPS D'ATTENTE



VIANDE ET ABATS
0 JOUR



OEUFS
0 JOUR



PRESENTATIONS



X10

Solution
Injectable sous cutané
ou intramusculaire
Flacon 20mL
Boîte de 10 flacons



X1

Solution
Injectable sous cutané
ou intramusculaire
Flacon 50mL
Boîte de 1 flacon



X1

Solution
Injectable sous cutané
ou intramusculaire
Flacon 500mL

CONSERVATION

- +4 à +8°C
- La durée de conservation est de deux ans

