

VACCINS



CHIENS - CHATS - RUMINANTS
PORCINS - EQUINS



LOBIVAC® RAGE

**VACCINER LES CHIENS, LES
CHATS ET D'AUTRES ESPECES
CONTRE LA RAGE...**



**... GRÂCE À UN VACCIN
INACTIVÉ EFFICACE ET FACILE
D'UTILISATION**





CHIENS - CHATS - RUMINANTS
PORCINS - EQUINS

VACCINS

LOBIVAC® RAGE



INDICATIONS

Prévention



Virus

Vaccin inactivé contre la rage
(Rhabdoviridae)



COMPOSITION

Flacon de solution contenant 1 dose de vaccin
1 dose de vaccin (1mL)

- VIRUS RABIQUE INACTIVÉ MIN. 2 UI** (souche CTN-1)
Virus rabique souche CVS-11 $\geq 10^{7.5}$ TCID₅₀/mL



ADMINISTRATION



FORME GALÉNIQUE

Voie Injectable



Sous-cutanée



Intramusculaire

Solution injectable



POSOLOGIE

Dilution

Utiliser le produit pur

Administration

Dose : 1 mL par animal
Seuls les animaux sains doivent être
vaccinés à partir de 12 semaines
d'âge.

Durée d'utilisation
Durée d'action



Une prise unique (Primovaccination)*
Rappel: tous les ans

IMMUNITÉ : 2-3 semaines après la vaccination et pour une durée de 12 mois.

- * En cas de risque infectieux important, il est possible de vacciner les animaux vers 6 semaines d'âge, mais il est alors vivement recommandé d'administrer une seconde dose 2 à 4 semaines après.



TEMPS D'ATTENTE



VIANDE ET ABATS
0 JOUR



LAIT
0 JOUR



PRESENTATIONS



X12



Solution



Injectable sous cutané
ou Intramusculaire



Flacon de 1mL



Boîte de 12 flacons

(Chaque boîte contient 12 doses)

CONSERVATION

- 2-8°C
- La durée de conservation est de 2 ans

