

**ANTIPARASITAIRES
INTERNES**



RUMINANTS



LOXINIL²⁵

**TRAITER LES VERS RONDS ET
LES DOUVES ET LES LARVES DE
MOUCHES...**



**... GRÂCE À UN
ANTIPARASITAIRE INTERNE
INJECTABLE À BASE DE NITROXINIL**





RUMINANTS

ANTIPARASITAIRES
INTERNES

LOXINIL²⁵



INDICATIONS



Vers ronds

Haemonchus contortus, d'*Haemonchus placei*,
Oesphagostumum radiatum, *Bunostomum*
phlebotomum, *Parafilaria Bovicola*



Trématodes

Fasciola hepatica (formes
larvaires et adultes)



Larves de mouches

Oestrose



COMPOSITION

100 mL de solution

NITROXINIL 25g

Excipients q.s.p. 100 mL



ADMINISTRATION

Voie Injectable



Sous-cutané



FORME GALÉNIQUE

Solution injectable



POSOLOGIE



Infestation subaiguë
ou chronique

1 mL pour 25 kg PV



1,3 mL pour 25 kg PV

Durée d'utilisation



Une prise unique

Fréquence d'administration

- En début de saison pluvieuse, avec un rappel 15 jours après
- Avant une vaccination, Au sevrage, Avant la mise-bas, Avant la saillie...



TEMPS D'ATTENTE



**NE PAS UTILISER CHEZ LES FEMELLES
PRODUCTRICES DE LAIT DE CONSOMMATION**



**VIANDE
ET ABATS
66 JOURS**



PRESENTATIONS



Solution
Injectable (sous-cutanée)
Flacon 50mL
Boîte de 1 flacon



Solution
Injectable (sous-cutanée)
Flacon 100mL
Boîte de 1 flacon



Solution
Injectable (sous-cutanée)
Flacon 250mL
Boîte de 1 flacon

