



PASTEVEC BOVIN

**VACCINER CONTRE
LA PASTEURELLOSE BOVINE ...**



**... GRÂCE À UN VACCIN
INACTIVÉ EFFICACE ET FACILE
D'UTILISATION**





RUMINANTS

VACCINS

PASTEovac BOVIN



INDICATIONS

Prévention



Bactéries

Vaccin inactivé contre la Pasteurellose bovine
(*Pasteurella multocida*)



COMPOSITION

Flacon de solution contenant 50 doses de vaccin
1 dose de solution vaccinale (2 mL)

- Souche atténuée de **PASTEURELLA MULTOCIDA SÉROTYPE B** titrant $20 \cdot 10^9$ corps bactériens par dose.
- Excipientsq.s.p. 2 mL



ADMINISTRATION



FORME GALÉNIQUE

Solution injectable

Voie Injectable



Sous-cutanée
Dans le cou



POSOLOGIE

Dilution

Utiliser le produit pur

Administration

Dose : 2 mL par bovin
Seuls les animaux sains doivent être vaccinés.

Durée d'utilisation
Durée d'action



Une prise unique
Rappel: tous les 6 mois

IMMUNITÉ : 10 jours après la primovaccination et pour une durée de 6 mois.



TEMPS D'ATTENTE



VIANDE ET ABATS
0 JOUR



LAIT
0 JOUR



PRESENTATIONS



X1

- Solution
- Injectable sous cutané
- Flacon de 100 mL de 50 doses

CONSERVATION

- 6 mois à une température de +20°C.
- 1 an à une température de +4°C.

