



PERIBOVAC T1-44

**VACCINER CONTRE LA
PÉRIPNEUMONIE CONTAGIEUSE
BOVINE (PPCB) SOUCHE T1-44 ...**



**... GRÂCE À UN VACCIN VIVANT
EFFICACE ET FACILE
D'UTILISATION**





PERIBOVAC

T1-44



INDICATIONS

Prévention



Bactéries

Vaccin vivant atténué contre la Péripleumonie Contagieuse Bovine (PPCB)
(*Mycoplasma mycoides*)



COMPOSITION

Flacon de lyophilisat contenant 50 ou 100 doses de vaccin
1 dose de vaccin

- Souche atténuée de **MYCOPLASMA MYCOIDES SUBSP. MYCOIDES** titrant au minimum 10^7 mycoplasmes vivants par dose (souche T1-44).
- Excipient : q.s.p. 1 dose



ADMINISTRATION



FORME GALÉNIQUE

Voie Injectable



Sous
Cutanée



POSOLOGIE

Dilution

Reconstituer le vaccin :

- 1 flacon de lyophilisat de 100 doses pour 100 mL de diluant.
- 1 flacon de lyophilisat de 50 doses pour 50 mL de diluant

Administration

Dose : 1 mL par animal

Seuls les animaux sains doivent être vaccinés.

Durée d'utilisation
Durée d'action



Une prise unique
Rappel: tous les ans

IMMUNITÉ : 14 jours après la vaccination et pour une durée d'un an.



TEMPS D'ATTENTE



VIANDE ET ABATS
0 JOUR



LAIT
0 JOUR



PRESENTATIONS



X1



Lyophilisat pour solution injectable
Sous cutané (Après dilution dans le diluant)
Flacon de lyophilisat à diluer dans 50 mL de diluant (50 doses)



X1



Lyophilisat pour solution injectable
Sous cutané (Après dilution dans le diluant)
Flacon de lyophilisat à diluer dans 100 mL de diluant (100 doses)

CONSERVATION

- 24 mois à une température inférieure à -20°C.
- 6 mois à une température de +4°C.

