

**ANTI-INFECTIEUX
OU ASSIMILÉS**



**RUMINANTS
PORCINS - EQUINS**



STREPEN[®] MAXI

**TRAITER LES INFECTIONS CAUSÉES
PAR LES BACTÉRIES SENSIBLES À LA
PÉNICILLINE ET À LA STREPTOMYCINE ...**



**... GRÂCE À UN INJECTABLE
À BASE DE DEUX ANTIBIOTIQUES
DONT L'ACTIVITÉ SYNERGIQUE A
ÉTÉ DÉMONTRÉE**





**RUMINANTS
PORCINS - EQUINS**

**ANTI-INFECTIEUX
OU ASSIMILES**

STREPEN[®] MAXI



INDICATIONS

Traitement



Bactéries

Germes sensibles à pénicilline et /ou à la streptomycine



COMPOSITION

100 mL de solution

PÉNICILLINE PROCAÏNE G 20g

DIHYDROSTREPTOMYCINE (sous forme de sulfate) 25g

Excipients q.s.p. 100mL



ADMINISTRATION



FORME GALÉNIQUE

Solution injectable

Voie
Injectable



Intramusculaire
profonde

Agiter avant utilisation



POSOLOGIE



1 mL pour 25 kg PV

Durée d'utilisation



**1 fois par jour
Pendant 3 jours consécutifs**

- Volume maximal par point d'injection pour chaque espèce cible :
Equins : 15mL, Bovins : 6mL, Ovins : 3mL, Porcins : 1,5mL



TEMPS D'ATTENTE



**NE PAS UTILISER CHEZ LES MOUTONS PRODUISANT
DU LAIT DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE.**



NE PAS UTILISER CHEZ LES CHEVAUX DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE.



PRESENTATIONS



Solution
Injectable
Flacon de 100mL
Boîte de 1 flacon

