



SYMPTEVAC

**VACCINER CONTRE LE CHARBON
SYMPTOMATIQUE DES
RUMINANTS...**



**... GRÂCE À UN VACCIN
INACTIVÉ EFFICACE ET FACILE
D'UTILISATION**





RUMINANTS

VACCINS

SYMPTEVAC



INDICATIONS

Prévention



Bactéries

Vaccin inactivé contre le charbon symptomatique
(*Clostridium chauvoei*)



COMPOSITION

Flacon de solution contenant 50 ou 100 doses de vaccin
1 dose de solution

- **ANACULTURES CLOSTRIDIUM CHAUVOEI** titrant 10^9 corps bactériens par dose.
- Excipientsq.s.p. 1 dose



ADMINISTRATION



FORME GALÉNIQUE

Solution injectable

Voie Injectable



Sous-cutanée
Dans le cou



POSOLOGIE

Dilution

Utiliser le produit pur

Administration

Dose : 2 mL par bovin
Seuls les animaux sains doivent être vaccinés.

Durée d'utilisation
Durée d'action



Une primovaccination
(une injection à l'âge de 3-6 mois puis
une deuxième 3-4 semaines après)
Rappel: tous les ans

IMMUNITÉ : 10 jours après la primovaccination et pour une durée de 12 mois.



TEMPS D'ATTENTE



VIANDE ET ABATS
0 JOUR



LAIT
0 JOUR



PRESENTATIONS



X1

- Solution
- Injectable sous cutané
- Flacon de 100 mL de 50 doses

CONSERVATION

- 1 an à une température de +20°C.
- 2 ans à une température de +4°C.

